

화상 안전



화재는 기기에 손상을 입히고 열로 인해 피부가 심각하게 화상을 입을 수 있습니다. 화상은 특정 도구 또는 태양에서 발생할 수 있습니다. 미국에서는 60초마다 누군가 화상으로 인한 치료가 필요합니다.



2018년에는 대략 7만명의 사람이 접촉화상 때문에 응급실에 갔습니다. 이 환자의 약 1/3은 5세 미만의 어린이였습니다.



오렌지 카운티 소방국

(714) 573-6200
ocfa.org



화상의 종류

1도 화상 (경미)

- 1도 화상은 대개 발적과 경미한 통증을 유발합니다.

2도 화상 (보통)

- 2도 화상은 일반적으로 축축하거나 물집이 있는 밝은 적색입니다.

3도 화상 (중증)

- 3도 화상은 숯 또는 잿빛으로 보이고 검은색 또는 갈색입니다.
- 이러한 화상은 기능 상실, 사지 상실, 변형, 재발성 감염 및 때때로 사망을 포함하여 치명적인 부상을 초래할 수 있습니다.

화상을 치료하는 법

- 열원을 끄고 주변이 안전한지 확인합니다.
- 화상 부위 주변의 의복과 장신구를 제거하되 화상 부위 주변의 옷을 강제로 벗기지 마십시오.
- 통증이 가라앉을 때까지 5-10분 동안 화상 부위를 찬물(얼음물 제외)에 담그십시오.
- 화상 부위를 축축하게 유지하기 위해 항생제 연고나 드레싱을 바르십시오. 버터, 치약 또는 계란과 같은 크림 또는 기름기 많은 물질을 사용하지 마십시오. 감염을 일으킬 수 있습니다.
- 이동성 또는 감각에 영향을 미치는 화상이 있거나 손 크기 보다 큰 화상이 있거나 화상이 발, 얼굴, 눈 또는 생식기에 영향을 미치는 경우 911로 전화하십시오.

화상 예방 팁

- 뜨거운 물체나 제품 주위에 최소 3피트의 안전 지대(safety zone)를 만드십시오.
- 뜨거운 물건을 방치하고 말고 사용하지 않을 때는 기기의 플러그를 뽑으십시오.
- 뜨거운 물건을 카운터 가장자리와 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.